

## انواع ضد عفونی کننده های موجود در بخشهای درمانی بیمارستان

نام محلول	کاربرد	روش مصرف	خصوصیات
<p style="text-align: right;"><b>سپتی ژل</b></p> 	ژل الکلی ضد عفونی کننده مخصوص پوست دست	مقداری از سپتی ژل را بر روی دست پمپ نموده و هر دودست را به روش صمیع و زمان ۲۰-۳۰ ثانیه مالش دهید.	*مخلوط دونوع الکل به همراه عصاره آلوئه ورا و ویتامین E برای جلوگیری از بروز مساسیت های پوستی و سوزش
<p style="text-align: right;"><b>سپتی سیدین - سپتی سیدین PC</b></p> 	مخلول الکلی ضد عفونی کننده مخصوص دست	۲ تا ۳ میلی لیتر از مخلول را بر روی دست اسپری نموده و به طور کامل دو دست را به روش صمیع و زمان ۲۰-۳۰ ثانیه مالش دهید.	* مخلوط دو نوع الکل * بدلیل وجود کلرهگزیدین در سپتی سیدین PC پایداری اثرات ضد میکروبی مخلول به مراتب افزایش یافته است.
<p style="text-align: right;"><b>سپتی اسکراب</b></p> 	اسکراب قبل از عمل دست جراح و کادر اتاق عمل	مقدار ۵ میلی لیتر مخلول را کف دست ریخته و به مدت ۳-۵ دقیقه دست و ساعد را با مخلول بشوئید و این کار را برای دست دیگر تکرار نموده و سپس آبکشی و خشک نمایید.	* فاصیت پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی همزمان دارد و دارای فاصیت آنتی میکروبیال پایدار به مدت ۶ ساعت پس از استفاده می باشد.
<p style="text-align: right;"><b>بادی پرپ</b></p> 	ضد عفونی و آماده سازی پوست قبل از عمل جراحی <b>توجه:</b> در اعمال جراحی پرده مننژ مغز، قزنبه چشم و بافت گوش میانی استفاده نشود.	نوامی مورد نظر پوست را با مخلول بادی پرپ آغشته نموده و پس از انجام پرپ پوستی، مداکثر ۶۰-۳۰ ثانیه صبر نموده تا خشک شود. از اسپری نمودن این اسپری به سمت چشم و گوش به شدت اجتناب نمائید.	فاقد عوارض جانبی ناشی از ترکیبات ید (بتادین) بوده و علاوه بر فاصیت ضد عفونی کنندگی قوی، مداقل ۶-۱۴ ساعت پس از استفاده، اثرات ضد میکروبی خود را حفظ می کند.
<p style="text-align: right;"><b>سپتی پرپ (مخلول الکلی ماوی کلرهگزیدین)</b></p> 	ضد عفونی پوست محل تزریقهای SC,IV,IM	مخلول را بطور مستقیم در محل مورد نظر اسپری کرده و صبر کنید تا خشک شود. در صورت آلودگی نامیه مورد نظر به چربی ها و یا آلودگی های دیگر، محل را قبلا با آب و صابون شستشو دهید.	کلرهگزیدین موجود در مخلول الکلی اثر ضد میکروبی ماندگار فراهم می کند..

نام محلول	کاربرد	روش مصرف	خصوصیات
سپتی سرفیس	اسپری ضدعفونی کننده سریع و تمیز کننده سطوح و ابزار	قبل از استفاده از محلول سطح مورد نظر را تمیز و خشک کنید. مقدار مناسبی از محلول را روی سطوح آلوده اسپری نموده و اجازه دهید خشک شود.	این محلول در مدت ۱ تا ۲ دقیقه فعالیت ضد میکروبی خود را اعمال می کند.
سپاسیت HP	ضدعفونی کننده سطوح، تفت، تشک و..	محلول را به صورت ۲ درصد (۲۰ سی سی در یک لیتر) رقیق نمایید و به سطوح و کف اسپری نموده و بعد از ۵ دقیقه اسفنج کشتی نمایید. در صورت تهیه محلول با رقت ۱/۵ و یا ۱ درصد زمان ماندگاری روی سطوح را به ترتیب به ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه افزایش دهید.	* محلول رقیق شده در صورت نگهداری در ظروف در بسته و تمیز تا ۱۴ روز قابل استفاده می باشد. * از استفاده همزمان محلول با پاک کننده های آنیونیک فودداری گردد.
سپاسیت HI	ضدعفونی کننده متوسط الاثر ابزار پزشکی	محلول را به صورت ۲ درصد (۲۰ سی سی در یک لیتر) رقیق نمائید و قطعات ابزار را در صورت امکان از هم جدا نموده و بعد از شستشو در محلول رقیق شده غوطه ور نمایید. بعد از ۲۰ دقیقه غوطه وری ابزار را آبکشی نمایید. در صورت تهیه محلول با رقت ۱ یا ۱/۵ درصد زمان غوطه وری افزایش می یابد.	* محلول رقیق شده به مدت ۱۴ روز در ظرف در بسته پایدار و قابل استفاده می باشد. * در صورت آلودگی ظاهری محلول رقیق شده، آنرا با محلول تازه آماده شده جایگزین کنید. * از استفاده همزمان با پاک کننده های آنیونیک فودداری گردد.
وتی دس GF	اسپری آماده به مصرف غیر الکلی با اثر همزمان ضدعفونی و پاک کنندگی جهت سطوح، ابزار و تجهیزات مساس به الکل مانند پروب های ultra sound و صفحات پلکسی گلاس	محلول را روی دستمال تمیز اسپری و روی سطح مورد نظر بکشید و یا مستقیماً روی سطح یا ابزار اسپری نموده و پس از ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه دستمال بکشید.	سریع الاثر



خصوصیات	روش مصرف	کاربرد	نام محلول
<p>*در صورت نگهداری محلول در ظرف در بسته قابلیت باز مصرف ۳۰ روزه دارد و با استفاده از اندیکاتورهای اعتبار سنجی می توانید غلظت گلوترآلدئید را بررسی نمایید.</p>	<p>*جهت ضدعفونی سطح بالای وسیله پزشکی، قطعات ابزار را در صورت امکان از هم جدا نموده و بعد از شستشو ( ترجیحا با محلول آنزیماتیک ) در محلول به مدت ۴۵ دقیقه غوطه ور نمایید، سپس ابزار را خارج نموده و سه بار آبکشی نمایید.</p> <p>* جهت استریلیزاسیون وسیله، ابزار و تجهیزات را به مدت ۱۰ ساعت در دمای محیط درون محلول غوطه ور نموده سپس با رعایت اصول آسپتیک از محلول خارج و با آب استریل سه بار آبکشی نمایید.</p>	<p>استریل کننده و ضدعفونی کننده سطح بالا با پایه گلوترآلدئید ۲/۶۵% جهت ابزار پزشکی میاتی و نیمه میاتی مساس و مقاوم به حرارت مانند آندوسکوپ ها ، ابزار جراحی، تجهیزات پزشکی محلول آماده مصرف بدون نیاز به رقیق سازی و بدون نیاز به فعال کننده می باشد.</p>	<p><b>ویویساید</b></p> 

تهیه و تنظیم : واحد کنترل عفونت بیمارستان

