

## کاتتر وریدی مرکزی (شالدون) چیست ؟

کاتتر وریدی مرکزی نوعی کاتتر موقت است. زمانیکه بطور اورژانس نیاز به دیالیز داشته باشید و از قبل برایتان فیستول مناسب آماده نباشد، با روش جراحی در سیاهرگ مرکزی گردن و یا سینه و یا سیاهرگ رانی شما یک لوله پلاستیکی کار می‌گذارند تا از طریق آن بتوانید دیالیز شوید. برخلاف فیستول، کاتتر بلافاصله قابل استفاده است.

کاتترهای دائمی، کاتترهایی هستند که مدت طولانی‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرند .

این روش در بیمارانی استفاده می‌شود که عروق محیطی خوبی ندارند یا امکان انجام گرافت وجود ندارد مثل کودکان، افراد دیابتی و افراد خیلی چاق.



## چطور باید از کاتتر شالدون مراقبت کنیم ؟

کاتترهای موقت با بخیه سر جای خود محکم می‌شوند.

کاتترهای دائم را با یک روکش خاص و چند بخیه در زیر پوست محکم کار می‌گذارند .

از آنجا که قسمتی از کاتتر داخل بدن و قسمت دیگری از آن خارج از بدن است احتمال آلوده شدن و عفونت در آن زیاد است .

## چند نکته برای مراقبت از کاتتر شالدون:

■ کاتتر خود را همیشه تمیز و خشک نگه‌دارید. این به معنی آن است که نمی‌توانید شنا کنید یا حمام بروید.

■ مراقب باشید کاتترتان مخصوصاً " موقع تعویض لباس کشیده نشود، تیم دیالیز به شما آموزش می‌دهد که چگونه روی کاتتر را بپوشانید و از آن مراقبت کنید.


■ به سمتی که کاتتر شالدون دارید، نخوابید. روزانه پانسمان کاتتر شالدون را با مراجعه به درمانگاه تعویض کنید، یا با آموزش توسط خودتان ( یا همراه بیمار) تعویض گردد .

■ دوش گرفتن دستی بطوریکه ناحیه کاتتر شالدون در آب غوطه‌ور نشود بهترین روش است. اگر دوش گرفتن قبل از آمدن به دیالیز باشد بهتر است. پانسمان



بخش دیالیز

## شالدون چیست؟



بیمارگرایی:

از اعتماد و حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این  
مجتمع کمال تشکر را داریم.

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در  
خصوص بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و  
مراقبت آن می باشد.

تهیه و تنظیم: سعیده سادات مهماندوست

کمیته آموزش به بیمار

زمستان ۹۱

منابع: کتاب برونر سودارت (بخش دیالیز)

" قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم. "

با آرزوی بهبودی و سلامتی روزافزون

آدرس: کاشان- بلوار قلب راوندی- جنب دانشگاه  
علوم پزشکی

Email: [beheshtihospital@kaums.ac.i](mailto:beheshtihospital@kaums.ac.i)

تلفن تماس: ۰۲۱-۵۵۵۴۰۰۲۶-۲۹

۵۳۶۳

دورنما: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

جدید به همراه پماد آنتی بیوتیک بر روی محل  
خارجی گذارده شود .

■ در صورت نشت خون از محل ورود کاتتر به داخل  
بدن، به پرسنل بخش دیالیز اطلاع دهید.

■ در صورت باز شدن بخیه های متصل کننده کاتتر به  
پوست و بیرون آمدن آن هرگز کاتتر به داخل  
برگردانده نشود. کاتتر را ثابت کرده و به پرسنل بخش  
دیالیز اطلاع دهید.

■ از هرگونه تزریقات داخل کاتتر خودداری کنید.

■ به نشانه های عفونت مانند قرمزی ورم، درد،

چرک، تب توجه داشته باشید و با مشاهده هر یک از

این علائم با پزشک خود تماس بگیرید.