

کلیه ها دو عضو لوبیایی شکل هستند که در ناحیه پهلوها قرار دارند. کلیه‌ها وظایف زیر را در بدن انجام می‌دهند.


- کنترل آب و الکترولیت‌های بدن
- کنترل مواد معدنی موجود در بدن
- دفع سموم و مواد زائد از خون
- کمک به تنظیم فشار خون
- کمک به خون‌سازی

نارسایی مزمن کلیه چیست؟

نارسایی مزمن کلیه به نقص غیر قابل برگشت عملکرد و کار کلیه گفته می‌شود. نارسایی کلیوی مزمن، به آرامی رخ داده و در مراحل اولیه علائم کمی دارد. بسیاری از افراد از نارسایی کلیه خود در این حالت اطلاعی ندارند تا زمانی که عملکرد کلیه‌ها به کمتر از ۲۵ درصد حد نرمال می‌رسد.

دلایل ایجاد نارسایی مزمن کلیه کدامند؟

- فشار خون بالا
- دیابت
- سنگ‌های کلیه
- عفونتهای ادراری (بخصوص در اطفال)
- سابقه فامیلی
- سابقه مصرف ضد درد‌ها به مدت طولانی مدت



نارسایی مزمن کلیه با چه علائمی همراهند؟

بطور کلی این حالت منجر به بروز مسائلی نظیر نارسایی احتقانی قلب، استخوانهای ضعیف، زخمهای معده و صدمه به سیستم اعصاب مرکزی خواهد شد. متأسفانه زمانی که صدمات غیر قابل برگشت رخ ندهد، علائم ایجاد نمی‌شود. این علائم شامل موارد زیر می‌باشند:

- فشار خون بالا
- کاهش وزن غیر قابل توجیه
- کم خونی
- تهوع و استفراغ
- کاهش اشتها
- ضعف و خستگی
- سردردی که هیچ علت خاصی ندارد
- کاهش عملکرد ذهنی
- انقباضات عضلانی
- خونریزی در دستگاه گوارش
- لکه های زرد مایل به قهوه ای بر روی پوست
- خارش دائمی
- اختلالات خواب

در چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید؟

اگر فردی مبتلا به بیماریهای مزمن هستید، باید در طی ویژگیهای معمول خود توسط پزشک از نظر فشار خون و عملکرد کلیوی، آزمایش ادرار و خون مورد بررسی قرار گیرید. اگر فردی

دچار علائم مربوط به نارسایی مزمن کلیه نیز هستید، باید به پزشک مراجعه نمایید.

نارسایی مزمن کلیه چگونه تشخیص داده می‌شود؟

در صورت وجود دیابت باید محتوای ادرار شما از نظر وجود پروتئین چک شود. این آزمایش جهت غربالگری و شناخت مراحل اولیه اختلال عملکرد کلیوی در طی دیابت می‌تواند مفید باشد.

اگر شک به وجود نارسایی حاد یا مزمن کلیوی در خود دارید، باید حتماً جهت اندازه گیری مواد زائد خون نظیر اوره ، کراتینین، آزمایش خون و آزمایش ادرار به پزشک مراجعه کنید. بعلاوه جهت بررسی وجود مایع در ریه‌ها می‌توان از آنها عکسبرداری نمود.

بعلاوه جهت تایید و یا کمک به تشخیص نارسایی کلیوی می‌توان از روشهای تشخیصی نظیر سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی و نمونه‌برداری از کلیه‌ها نیز استفاده نمود.

روشهای پیشگیری از نارسایی مزمن کلیه کدامند؟

معمولاً پیشگیری از بروز نارسایی کلیه غیر ممکن است اما می‌توان شانس بروز آن را کاهش داد. جهت پیشگیری موارد زیر را رعایت کنید:

از مصرف الکل یا داروهای خاص اجتناب ورزید.



بخش نفرولوژی

نارسایی مزمن کلیه



بیمارگرما:

از اعتماد و حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این
مجتمع کمال تشکر را داریم.

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در
خصوص بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و
مراقبت آن می باشد.

«کمیته آموزش به بیمار»

بهار ۹۲

- اگر داروهای ضد فشار خون مثل کاپتوپریل، لوزارتان، آنالاپریل را بصورت حداقل یک ماه مصرف می کنید.
- در صورتی که به روماتیسم مفصلی، سائیدگی مفاصل و یا سایر بیماری های خود ایمنی مبتلا هستید.
- در صورتی که دچار ضایعات نخاعی و یا دارای سابقه سکتة مغزی هستید که منجر به از کار افتادگی شما شده است.

**با مراجعه به موقع به پزشک می توانید از نارسایی دائمی
عملکرد کلیه پیشگیری کنید.**

منابع: کتاب پرستاری برونر سودارث (بخش کلیه)

" قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم. "

با آرزوی بهبودی و سلامتی روزافزون

آدرس: کاشان- بلوار قلمب راوندی- جنب دانشگاه علوم پزشکی

Email: beheshtihospital@kaums.ac.ir

تلفن تماس: ۰۲۶۱-۵۵۵۰۰۲۶-۲۹

داخلی ۵۷۳-۵۸۱

دورنما: ۰۲۶۱-۵۵۵۰۰۲۶

سعی کنید با موادی نظیر فلزات سنگین، حلالها یا سایر مواد
سمی کمتر تماس داشته باشید.

در صورت وجود بیماری مزمن حتماً بطور دقیق به توصیه های
پزشک خود عمل کنید.

اگر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه هستید و قصد بارداری دارید،
حتماً با پزشک خود مشورت نموده و از مسائل مربوط به این
دوران آگاه شوید و اگر هم حامله هستید حتماً تحت مراقبتهای
ویژه پزشک خود باشید.

اگر مبتلا به مراحل انتهایی بیماری کلیوی هستید، از مصرف
آب و مایعات زیاد پرهیز نمایید.

در صورتیکه مصرف مایعات کم شود ممکن است تحمل تشنگی
سخت باشد که می توان اقدامات نظیر مکیدن یک قاچ لیمو، یا
لیسیدن یک تکه یخ، خیس کردن لبها با آب، جویدن آدامس را
جهت غلبه بر آن انجام داد.

اگر به دیابت (مرض قند) یا فشار خون بالا مبتلا هستید هر ۳
ماه یکبار به خانه بهداشت یا مراکز بهداشتی در مانی مراجعه
نمایید.

حتماً اگر جزء افراد زیر هستید هر ۶ ماه یکبار به خانه بهداشت
یا مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید:

- اگر از سوند (لوله ادراری) دائمی استفاده می کنید.
- اگر از داروهای مسکن مثل بروفن، دیکلوفناک، ناپروکسن، استامینوفن، آسپرین و حداقل به مدت ۱ ماه پشت سر هم استفاده می کنید.