

افت قند خون در بعضی از نوزادان باعث بروز علائم زیر

می‌شود:

▪ لرزش

▪ گریه ضعیف

▪ تحریک پذیری

▪ بی‌حالی

▪ سرد شدن اندامها

اگر افت قند خون نوزاد به موقع تشخیص داده نشده و

درمان مناسب انجام نشود می‌تواند باعث بروز تشنج

حتی آسیب مغزی در نوزاد شود.

در صورتی که نوزاد به علت کاهش قند خون در بخش

بستری شده یا در بررسی‌ها کاهش قند خون نوزاد

مشخص شود این اقدامات برای نوزاد انجام می‌شود:

▪ در صورتی که شرایط نوزاد اجازه بدهد تغذیه با

شیرمادر یا در صورت تحویز پزشک شیر خشک برای

نوزاد دستور داده می‌شود.

▪ برای نوزاد رگ مناسب تعبیه شده و سرم حاوی

قند برای وی تزریق می‌شود.

▪ در فواصل مختلف قند خون نوزاد کنترل می‌شود تا

میزان بهبودی مشخص شود( توسط نوار قند خون یا

ارسال به آزمایشگاه )

▪ ممکن است برای نوزاد آزمایشات اضافه‌تری

درخواست شود تا علت کاهش قند خون مشخص شود.

▪ بعد از بهبودی و زمانی که میزان شیر خوردن نوزاد

به حد کافی رسید ؛ داروها و سرم نوزاد به تدریج کم و

سپس قطع می‌شود.

بیشتر موارد افت قند خون نوزادی گذرا بوده و بعد از

درمان؛ مجددا اتفاق نمی‌افتد.

اگر درمان به صورت کامل انجام شود ؛ کاهش قند

خون برای نوزاد عارضه خاصی ایجاد نمی‌کند.

در هنگام جابجایی و در آغوش گرفتن نوزاد مراقب رگ

نوزاد باشید ؛ تا از خروج اتفاقی آن جلوگیری شود.



نوزادان

## کاهش قندخون



بیمارگرایی:

از اعتماد و حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این مجتمع

کمال تشکر را داریم.

بمفاتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در خصوص

بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن

می باشد.

تهیه و تنظیم: معصومه تقی زاده

کمیته آموزش به بیمار

زمستان ۹۱

منابع: کتاب نلسون

در طی مدت درمان با پرسنل بخش همکاری داشته

باشید و از مقررات بخش پیروی نمائید.

" قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم. "

با آرزوی بهبودی و سلامتی روزافزون

آدرس: کاشان- بلوار قلب راوندی- جنب دانشگاه علوم

پزشکی

Email: beheshtihospital@kaums.ac.i

تلفن تماس: ۰۳۶۱-۵۵۵۰۰۲۶-۲۹

۲۱۸-۲۸۲

دورنما: ۰۰۸۹۰۰۰۰۰۰