

بعضی از نوزادان در دوره نوزادی حرکات تشنجی از

خود نشان می دهند.

تشنج در دوره نوزادی با بچه‌های بزرگتر و بزرگسالان

متفاوت است.

گاهی حرکاتی مانند چشمک زدن، مکیدن، پدال زدن

اگر با کم شدن مقدار اکسیژن خون یا افزایش تعداد

ضربان قلب همراه باشد تشنج محسوب می شود.

دلایل بروز تشنج در نوزادان کدامند؟

علت بروز تشنج در نوزادان می تواند موارد زیر باشد:

▪ کم بودن مقدار قند یا کلسیم خون نوزاد

▪ مشکلات مربوط به دوران حاملگی، عفونتها یا

بیماریهایی که مادر در طی بارداری داشته‌است.

▪ بعضی از نوزادان به‌طور مادرزادی در ساختمان یا

عملکرد مغزشان مشکلاتی دارند و یا سابقه بیماری در

خانواده وجود دارد.

علت بروز تشنج هرچه باشد باید آن را کنترل کرد.

هرچه تعداد موارد بروز تشنج کمتر باشد، عوارض و

پیامدهای آن کمتر است .



تشنج در نوزادان چگونه درمان می‌شود؟

برای درمان تشنج، بسته به نظر پزشک از درمانهای

مختلفی استفاده می‌شود:

▪ تزریق سرم ؛ دارو

▪ گرفتن نوار مغز و انجام MRI مغزی

▪ نوزاد را برای اطمینان از کنترل تشنج تحت نظر قرار

می‌دهند.

▪ اگر تشنج تکرار نشد، معمولاً داروها را به تدریج کم

کرده و قطع می‌کنند.

▪ تعیین وضعیت نوزاد در آینده از نظر تکرار تشنج و

یا شدت آسیب مغزی معمولاً به راحتی قابل پیش‌بینی

نیست و نیاز به گذشت زمان دارد.



نوزادان

تشنج در نوزادی



بیمارگرایی:

از اعتماد و حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این مجتمع

کمال تشکر را داریم.

بمفاتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در خصوص

بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن

می باشد.

تهیه و تنظیم: معصومه تقی زاده

کمیته آموزش به بیمار

زمستان ۹۱

منابع: کتاب نلسون

توجه به این نکته لازم است که بروز تشنج در دوره

نوزادی بیشتر از هر دوره دیگری در طول زندگی است

" قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم. "

با آرزوی بهبودی و سلامتی روزافزون

و بسیاری از موارد تشنج در دوره نوزادی عوارض

جدی به همراه ندارند.

در صورت ترخیص نوزاد با داروهای ضد تشنج در

آدرس: کاشان- بلوار قلمب راوندی- جنب دانشگاه علوم

پزشکی

دادن به موقع و دقیق آنها توجه داشته باشید و

Email: beheshtihospital@kaums.ac.i

مراجعه به موقع به پزشک را فراموش نکنید.

تلفن تماس: ۰۲۶-۵۵۵۰۰۲۶-۲۹

۲۱۸-۲۸۲

دورنما: ۰۰۸۹۰۰۰۰۰۰