

متادون چیست؟

متادون از داروهای خانواده مخدرهاست که برای کنترل درد شدید و علائم ترک در افراد وابسته به مواد مخدر استفاده می‌شود. متادون، از شایع‌ترین عوامل مسمومیت کودکان در ایران می‌باشد.

دلایل مسمومیت کودکان با متادون چیست؟

- بی‌دقتی والدین در نگهداری متادون در یخچال و در دسترس کودکان
- بی‌دقتی تجویز کنندگان دارو در ظروف غیر استاندارد بدون برچسب



علائم مسمومیت با متادون در کودکان کدامند؟

- اختلال هوشیاری
- تهوع، استفراغ

اختلال تنفسی

نبض ضعیف

تکانه‌های عضلانی

چگونه می‌توان از مسمومیت با متادون

پیشگیری کرد؟

- مواد سمی و داروها دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
- داروها و سایر سموم در برابر کودک بصورت مقاوم بسته بندی شود.
- دارو در مقادیر غیر کشنده توزیع شود.
- جذابیت بسته‌های دارو و مواد سمی کاهش یابد.
- داروها و مواد سمی در ظروف پلاستیکی دارای قفل کودک بجای ظروف شیشه‌ای بسته بندی شود.
- سطح آگاهی و دانش والدین و مراقبین کودک در رابطه با نحوه نگهداری داروها و مواد سمی افزایش یابد.
- از تحویل گرفتن شربت متادون در شیشه‌های غیر دارویی و بدون برچسب خودداری شود.

از آنجایی که طعم شربت متادون شیرین است و مصرف کنندگان دارو در برخی موارد آن را به همراه چای یا نوشابه مصرف می‌نمایند

از نگهداری شربت متادون در داخل یخچال و در کنار بقیه نوشیدنی‌ها خودداری نمایید.

شربت متادون جهت درمان ترک اعتیاد، بسیار سمی است. آن را دور از دسترس خانواده و در کمد قفل دار نگهداری نمایید.

آیا می‌دانید نگهداری شربت متادون (جهت ترک اعتیاد) در ظرف خالی نوشابه، منجر به مصرف دارو، مسمومیت و مرگ چند کودک شده است؟

به کودکان بیاموزید هیچ چیزی ننوشند و یا نخورند مگر اینکه با اجازه بزرگسالان باشد.

داروهای خود را در مقابل چشم کودکان نخورید، چرا که کودکان از رفتار بزرگسالان تقلید می‌کنند و ممکن است دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند.

زمانیکه شما در منزل نیستید و کودک را به فرد دیگری می‌سپارید، کودکان در معرض بیشترین خطر مسمومیت قرار دارند.



بخش اطفال

مسمومیت با متادون در کودکان



بیمارگرایی:

از اعتماد و حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این مجتمع
کمال تشکر را داریم.

بمفاتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در خصوص
بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن
میباشد.

تهیه و تنظیم: نرگس نادری

با نظارت

«کمیته آموزش به بیمار»

تابستان ۹۴

▪ شروع تزریق نالوکسان طبق نظر پزشک که علیه داروی
متادون و دیگر مخدرها تجویز می شود.

▪ کودک تا زمان بهبود حال عمومی در بیمارستان بستری
می ماند.

منابع: کتاب ویلی وونگ

"قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم."

با آرزوی بهبودی و سلامتی روزافزون

**آدرس: کاشان- بلوار قطب روانی- جنب دانشگاه علوم
پزشکی**

Email: beheshtihospital@kaums.ac.ir

تلفن تماس: ۰۲۶-۴۴۵۵۵۵۵-۳۱

بخش اطفال: ۰۲۶-۴۴۵۵۵۵۵

دورنما: ۰۲۶-۴۴۷۹۰۰۰۰

در صورت بروز مصرف متادون توسط کودکان چگونه رفتار کنید؟

▪ ضمن حفظ خونسردی، هر چه سریعتر
درخواست کمک کنید (با اورژانس ۱۱۵ تماس
بگیرید).

▪ تا زمان رسیدن اورژانس کودک را به پهلو
بخوابانید.

▪ باقیمانده ماده سمی یا قوطی را که نزدیک
بیمار است به بیمارستان ببرید یا به امدادگران
اورژانس نشان دهید.

پزشک و پرستار در صورت تشخیص مسمومیت با
متادون اقدامات زیر را برای کودک انجام می دهند:

▪ قرار دادن لوله معده

▪ شستشوی معده تا روشن شدن ترشحات معده

▪ وارد کردن پودر شارکول و سوربیتول به معده از
طریق لوله معده تا دارو بدون جذب شدن از روده دفع
شود.

▪ گرفتن رگ ثابت از کودک و ارسال آزمایشات لازم